

입상수화제 제형으로 사용이 편리한 광범위 종합살균제



고추 탄저병



마늘 흑색썩음균핵병

밀리언

입상수화제

품목명 : 테부코나졸 입상수화제 유효성분 : Tebuconazole 25% 계통 : 트리아졸계(사) 독성 : 저독성, 어독성 III급 포장단위 : 10g, 100g, 250g, 500g

「밀리언」 입상수화제 특징

- ① 적은 약흔, 안전한 제형
수화제에 비해 약흔이 적게 남으며, 가루가 날리지 않아 농작업자가 안전하고 편리하게 사용할 수 있습니다.
- ② 우수한 침투이행성 및 치료효과
약제가 식물체내로 신속히 침투이행되어 병원균을 사멸시켜 우수한 치료효과를 나타냅니다.
- ③ 손쉬운 작물 관리(배추,잔디)
생장억제 효과가 있어 잔디 예취 횟수 경감 및 배추 결구형성에 도움을 줄 수 있습니다.
- ④ 잔디밭 주변 생태계에 안전
조류, 어류, 토양생물, 벌 등 잔디밭 주변 생태계에 영향 없이 사용 가능합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	10g	수확 21일전	4회 이내
고추(단고추류)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 3일전	3회 이내
대추		발생초기 경엽처리		수확 14일전	
마늘	잎마름병	발병초 10일간격 경엽처리	20g	파종기	1회 이내
	흑색썩음균핵병	중구 파종후 분무처리	40g		
매실	탄저병	발생초기 경엽처리		수확 30일전	3회 이내
모과					
미나리	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전	4회 이내
배	검은별무늬병				
배추	검은무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 21일전	3회 이내
복분자	탄저병			발생초기 경엽처리	
블루베리		수확 3일전	3회 이내		
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10g	수확 30일전	4회 이내
	겉무늬썩음병	6월 중순부터 10일간격 경엽처리			
	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리			
석류	탄저병	발생초기 경엽처리			3회 이내
수박(복수박)		덩굴마름병			
시금치	점무늬병	발생초기 경엽처리		수확 14일전	3회 이내
아로니아	갈색점무늬병			수확 3일전	
앵두	탄저병			수확 14일전	
양미나리(셀러리)	검은무늬병	발병초 7일간격 경엽처리			3회 이내
양앵두(체리)	탄저병				
자두	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	10g(10/㎡)	-	-
잔디	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 토양관주처리			
포도	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리	10g	수확 14일전	3회 이내