

진딧물, 거침없는 어퍼컷 한방!



어퍼컷

액상수화제



복숭아혹진딧물



조팝나무진딧물

품목명 : 티아클로프리트 액상수화제 유효성분 : Thiacloprid 10% 계통 : 클로로니코티닐계 (4a) 독성 : 보통독성, 어독성 III급 포장단위 : 100mL, 250mL

「어퍼컷」액상수화제 특징

- ① 강한 침투이행성으로 잎 뒷면의 해충도 완벽방제
- ② 꿀벌에 안전하여 시설하우스 및 개화기 사용가능
- ③ 주요 천적에 안전하여 병해충 종합방제(IPM)에 적합한 약제

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	5mL	수확 3일전	3회이내
감귤	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리	10mL	수확 14일전	
	굴굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리			
감(단감)	매미나방	발생초기 경엽처리		수확 7일전	1회이내
갯기름나물(식방풍)	목화진딧물	다발생기 경엽처리		수확 3일전	3회이내
고추(단고추류)					
구기자	뽕나무각지벌레		수확 7일전	2회이내	
꾸지뽕나무	굴소리진딧물				
			꽃매미		
녹두	싸리수염진딧물	발생초기 경엽처리	수확 14일전	3회이내	
당근	복숭아혹진딧물				
	오이총채벌레				
대추	대추애기잎말이나방		수확 7일전	2회이내	
들깨(씨)	목화진딧물		수확 3일전		
들깨(잎)		다발생기 경엽처리			
매실	복숭아싸살이좀벌	만개 15일 이후 7일간격 경엽처리	수확 14일전	3회이내	
	뽕나무각지벌레	다발생기 경엽처리			
	조팝나무진딧물				
멜론	목화진딧물	발생초기 경엽처리	수확 7일전	2회이내	
머위	머위진딧물	다발생기 경엽처리	수확 14일전		
	목화진딧물				
모과	조팝나무진딧물		수확 21일전	3회이내	
목재류	아시아매미나방	목재류 분무처리	20mL	-	-

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준			
				사용시기	사용횟수		
무	대만총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	2회이내		
미나리	좀머리총채벌레						
밤	밤나무왕진딧물	발생초기 경엽처리	20mℓ	수확 21일전	3회이내		
배	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리				수확 3일전	
배추	무테두리진딧물						
버즘나무	버즘나무방패벌레						
벚나무류	벚나무깍지벌레	약충 발생초기 경엽처리	10mℓ	-	-		
	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리					
복분자	꽃매미	약충 다발생기 경엽처리					
복숭아	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리				수확 14일전	2회이내
블루베리	조팝나무진딧물					수확 3일전	3회이내
뽕나무(오디)	뽕나무깍지벌레	발생초기 7일간격 경엽처리				수확 7일전	2회이내
	뽕나무총채벌레						
사과	매미나방	발생초기 경엽처리				수확 21일전	
상추(양상추)	목화진딧물	다발생기 경엽처리				수확 3일전	
	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리					
소나무	북방수염하늘소(무인항공기)	성충우화최성기 경엽처리	606mℓ (2ℓ/10a)	-	-		
	솔수염하늘소(무인항공기)						
소나무(소나무류)	솔잎혹파리	6월 초순 성충발생기 수관처리	20mℓ				
수목류(수출입 검역용)	아시아매미나방	다발생기 경엽처리					
수박	매미나방	발생초기 경엽처리		수확 3일전	3회 이내		
순무	복숭아혹진딧물						
아로니아	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리		수확 7일전	2회이내		
	조팝나무진딧물						
양배추	매미나방	발생초기 경엽처리		수확 30일전	1회 이내		
양앵두(체리)	진딧물류						
오이	오이총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 2일전	3회이내		
옥수수	보리수염진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일전			
완두	싸리수염진딧물						
유채(잎)	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			2회이내		
	오이총채벌레						
인삼	미국선녀벌레	약충 발생기 경엽처리		수확 14일전	3회이내		
자두	뽕나무깍지벌레	약충 다발생기 경엽처리		수확 21일전	2회이내		
잣나무(비식용)	북방수염하늘소(무인항공기)	성충우화최성기 경엽처리	606mℓ(2ℓ/10a)	-	-		
참다래(키위)	뽕나무깍지벌레	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	2회이내		
청경채	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리		수확 21일전			
콩	싸리수염진딧물						
	콩진딧물						
팥	싸리수염진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일전			
포도	매미나방	발생초기 수관처리					
	포도애탈날개나방						
호두	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리		수확 14일전			



- 이 약제를 항공방제하는 경우 주변에 재배하는 십자화과(배추, 양배추, 갓, 겨자, 무 등)작물 및 콩과(콩, 강낭콩, 녹두, 팥 등) 작물에 약해가 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
- 이 농약은 영하5도(°C) 이하에서 얼 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 영하5도(°C) 이하로 내려가지 않도록 주의하시고, 만약 결빙된 경우라도 상온에서 서서히 녹여 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.