일년생잡초 방제 미리 미리 준비하세요!

바랭이

강아지풀

미리처

입제

품목명 : 에스-메톨라클로르 입제　유효성분 : S-Metolachlor 2.5%　계통 : 클로르아세타마이드계(H15)　독성 : 저독성, 어독성 Ⅲ급　포장단위 : 3kg

「미리처」 입제 특징

1 우수한 방제효과
클로르아세타마이드계의 흡수이행형 제초제로서 일년생 화본과 잡초(피, 바랭이 등) 및 사초과 잡초 (방동사니 등)에 우수한 효과를 나타냅니다

2 환경에 안전한 약제
기존의 메톨라클로르에 비해 적은 약량으로 우수한 약효를 발휘하므로 환경에 보다 안전합니다.

3 긴 약효 지속기간
약효 지속기간이 길어 비용은 물론 노동력을 줄여주는 경제적인 잡초발생 전 토양처리제입니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용량
감자	일년생잡초	파종복토 후 3일이내 토양처리	3kg
고구마		삽식후 3일이내 토양처리	
동부		파종 · 정식기 토양처리	
마늘		파종복토후(비닐멀칭전) 토양처리	
무		파종복토 후 3일이내 토양처리	
양파		정식전(비닐멀칭전) 토양처리	
콩		파종복토 후 3일이내 토양처리	
옥수수			
파		정식 후 잡초발생전 토양처리	

「미리처」 입제는 "메톨라클로르"의 약효 및 환경에 대한 안전성을 개선하여 만든 제품입니다

메톨라클로르에서 생물학적 활성이 낮은 R-form의 이성질체를 줄여서 만든 「미리처」의 원제는 메톨라클로르에 비해 대략 35%의 적은 원제로도 동일한 효과를 나타내는 환경적인 약제입니다.

사용 방법

1. 직파재배 : 씨앗을 뿌리고 흙을 곱게 부셔서 씨앗을 덮은 다음 토양 전면에 소정량을 골고루 뿌리십시오.

주의 사항

1. 반드시 잡초발생 전 또는 이미 발생된 잡초를 제거한 후 사용하십시오.
2. 쇠비름, 명아주 등 광엽잡초가 많이 발생하는 곳에서는 약효가 떨어지므로 주의하십시오.
3. 시설재배(비닐하우스) 및 비닐피복재배에서는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
4. 유기물이 적은 척박한 토양이나 사질토 및 과습한 토양에서는 약해 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
5. 무에 사용할 때에는 열무, 알타리무 등의 소형무에는 약해의 우려가 있으니, 사용하지 마시고 노지 파종하는 봄무, 가을무 재배지에서만 사용하십시오.