종합살균제(보호)

탄저도사

액상수화제

- 품목명 : 클로로탈로닐 · 디티아논 액상수화제
- 유효성분 : Chlorothalonil 20% + Dithianon 15%
- 계통 : 유기염소계(카) + 퀴논계(카)
- 독성 : 저독성, 어독성 Ⅰ급
- 포장단위 : 200㎖, 500㎖

탄저병 방제의 절대강자!

특징

최고의 '탄저병' 예방약제

대표적인 보호살균제 성분의 조합으로 발병 전 처리시 탁월한 예방효과를 기대할 수 있습니다.

다양한 과수 및 과채류 탄저병에 우수한 효과

각종 탄저병에 우수한 효과를 발휘하는 종합살균제입니다.

광범위한 적용범위 및 긴 약효 지속력

병원균의 포자발아와 균사생장을 저해하여 우수한 방제효과를 나타냅니다.

강한 내우성

강한 부착력으로 장마기 살포에도 적합합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	20㎖	수확 21일전	5회 이내
감귤	더뎅이병	춘지발생초 15일간격 경엽처리		수확 14일전	4회 이내
고추(단고추류)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 2일전	3회 이내
당근	검은잎마름병	발병초 20일간격 경엽처리		수확 21일전	2회 이내
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일간격 경엽처리		수확 14일전	3회 이내
	잎오갈병	발아직전 및 꽃피기직전 각 1회 경엽처리			
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	25㎖	수확 21일전	
	겹무늬썩음병	6월상순부터 10일간격 경엽처리	20㎖		
	탄저병				
수박(복수박)		발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일전	4회 이내
양파	노균병	발병초 7일간격 경엽처리			3회 이내
인삼	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 30일전	2회 이내
자두	잿빛무늬병	발병초기 7일간격 경엽처리		수확 7일전	3회 이내
포도	노균병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전	

사용방법

1. 이 농약은 예방위주로 사용하는 것이 효과적이므로 발병직전이나 발병전부터 예방적으로 사용하십시오.

주의사항

1. 하절기 고온에서는 유묘기, 유엽기 및 수세가 약한 작물의 경우에는 사용에 주의하십시오.
2. 유제, 유탁제 등 기름 성분 제형의 제품과 혼용할 경우 과실에 약흔 및 약반이 발생할 수 있으므로 사용에 주의하십시오

「탄저도사」 액상수화제 방제효과

사과 탄저병

[2012년 (주)한얼싸이언스 부설연구소]

「탄저도사」

대조약제

무처리



고추 탄저병

「탄저도사」

대조약제

[2006년 에스엠비티(주)기술연구소]



[2006년 충남대학교]



감귤 더뎅이병

[2011년 (주)한얼싸이언스 부설연구소]

「탄저도사」

대조약제

무처리



수박 탄저병

[2012년 (주)한얼싸이언스 부설연구소]

「탄저도사」

대조약제