

- 품목명 : 클로탈로닐 수화제
- 유효성분 : Chlorothalonil 75%
- 계통 : 유기염소계(카)
- 독성 : 저독성, 어독성 I 급
- 포장단위 : 500g

사계절 전천후 사용가능한 보호살균제

특징

광범위한 병해에 사용가능 방제 가능한 병해의 범위가 넓어 같은시기에 발생하는 병해를 동시에 방제할 수 있습니다.

사계절 사용가능한 종합 보호살균제 이른 봄부터 겨울철 하우스 재배까지 사용할 수 있습니다.

탁월한 내우성으로 장마기 사용에도 적합

우수한 작물 부착성으로 오래가는 약효

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	33g	수확 7일전	2회 이내
감귤	더듬이병	발병초(5월초순)부터 10일간격 경엽처리		수확 40일전	3회 이내
감자	역병	발병초부터 10일간격 경엽처리		수확 14일전	5회 이내
감초	갈색점무늬병	발병초 7일간격 경엽처리			3회 이내
고추(단고추류)	탄저병	발병초부터 10일간격 경엽처리			4회 이내
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워)	검은무늬병	발생초기 경엽처리	30g	수확 7일전	3회 이내
담배	붉은별무늬병	적심후 발병초기부터 10일간격 경엽처리	29g	수확 21일전	2회 이내
땅콩	갈색무늬병	발병직전 또는 발병초부터 10일간격 경엽처리	33g	수확 14일전	4회 이내
	검은무늬병		40g		
	그물무늬병				
마(산약)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 21일전	
마늘	잎마름병	발병직전 또는 발병초부터 10일간격 경엽처리	33g	수확 7일전	5회 이내
복숭아	앞오갈병	꽃이피기전 10일간격 경엽처리			2회 이내
사과	점무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리		수확 30일전	5회 이내
	탄저병		25g		
수수	겹둥근무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리	10g		1회 이내
양파	노균병		29g	수확 7일전	5회 이내
에케베리아(모닝듀)	검은점무늬병	발생초기 경엽처리	33g	발생초기	-
영산홍	녹병				
오이	노균병	발병초부터 10일간격 경엽처리		수확 3일전	5회 이내
참깨	잎마름병	발병직전 또는 발병초부터 10일간격 경엽처리	40g	수확 30일전	2회 이내
				수확 21일전	
포도	노균병	발병직전부터 10일간격 경엽처리			



주의 사항

1. 사과는 꽃이 진 직후부터 30일, 복숭아는 신엽전개(새싹)에 사용하면 약해의 우려가 있으므로 이 시기에는 사용하지 마십시오.
2. 포도 유과기에는 약해의 우려가 있으니, 봉지를 씌우 뒤 사용하시고 무대재배의 경우 7월 중순 이후에 사용하십시오.
3. 감(단감)에 사용하면 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.