

각지벌레약

각지치온

입상수화제

- 품목명 : 뷰프로페진 · 에토펜프록스 입상수화제
- 유효성분 : Buprofezin 15% + Etofenprox 8%
- 계통 : 치아디아진계(16) + 합성피레스로이드계(3a)
- 독성 : 저독성, 어독성 III 급
- 포장단위 : 500g

각지벌레류 방제의 새로운 트렌드

특징

속효성과 지효성을 겸비

탈피억제제인 치아디아진계 뷰프로페진과 접촉독인 합성피레스로이드계 에토펜프록스의 혼합제로 속효성과 지효성을 겸비, 각지벌레 알에 대한 부화억제 효과가 우수합니다.

이중 살충 효과

신경교란 및 탈피억제의 이중 살충 효과로 각지벌레에 확실한 방제효과를 나타냅니다.

주요 과수 해충 방제

피레스로이드 계통의 약제로 주요 과수 해충 방제에 효과적입니다.

안전성 및 편리성

가루가 날리지 않아 농작업자가 안전하고 편리하게 사용 가능합니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 200당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	감꼭지나방	발생초기 10일간격 경엽처리	20g	수확 21일전	3회 이내
	감나무주머니각지벌레	다발생기 경엽처리			
감귤	네눈썹가지나방	발생초기 경엽처리		수확 14일전	2회 이내
	화살각지벌레	다발생기 경엽처리			
배	가루각지벌레	다발생기 경엽처리		수확 14일전	3회 이내
복숭아					
콩	툽다리개미허리노린재	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 21일전	2회 이내
포도	가루각지벌레	부화유충 다발생기 경엽처리			



1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
2. 8월에는 감(단감)에 약해우려가 있으니 사용에 주의 하십시오.