

위드헌터

유제/입제

- 품목명 : 메톨라클로르 유제 / 입제
- 유효성분 : Metolachlor 40% / 4%
- 계통 : 아세트아닐라이드계(H15)
- 독성 : 저독성, 어독성 III급
- 포장단위 : (유제) 300mL, (입제) 3kg

발잡초 방제 – 위드헌터로 싹!

특징

잡초 발생직전에 사용하는 제초제 아세트아닐라이드계의 흡수이행형 약제로 토양처리형 제초제입니다.

화본과 잡초 및 광엽 잡초에 효과 발에 발생하는 일년생 화본과 잡초 및 일부 광엽 잡초에 살초효과가 있습니다.

[유제] 적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	물 20L당 사용약량	1,000m ² (10a)당 사용량	
				약량	살포량
고추	일년생잡초	정식전(비닐피복전) 토양처리	40ml	200ml	100L
땅콩		파종복토후(비닐피복전) 토양처리			
마늘			50ml	250ml	
콩		파종복토후 토양처리	60ml	300ml	

[입제] 적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	1,000m ² (10a)당 사용량
고구마	일년생잡초	삼식후 3일 이내 토양처리	4kg
고추		정식전(비닐피복전) 토양처리	3kg
글라디올러스		정식후 3일 이내 토양전면처리	4kg
땅콩		파종복토후(비닐피복전) 토양전면처리	3kg
마늘			4kg
옥수수		파종복토후(잡초발생전) 토양처리	3kg
콩			
파		정식후(잡초발생전) 토양전면처리	



1. 이식재배작물 : 지면을 잘 고르고 소정의 약량을 살포한 후 비닐피복한 다음 작물을 이식하십시오.
2. 직파재배작물 : 씨앗을 뿌리고 흙을 곱게 부수어 씨앗을 덮은 다음 토양전면에 소정약량을 골고루 살포하십시오.
3. 파, 글라디올러스 : 정식 후 3일 이내에 소정 약량을 토양 전면에 골고루 뿌리십시오. (입제)



1. 사용시기 및 사용약량을 꼭 지키시고 심한 모래땅에서는 사용을 피하고 과습한 상태의 토양에서는 물을 빼서 토양이 마른 다음에 약을 뿌리십시오.
2. 이 농약은 잡초가 발생된 후에 사용하면 효과가 떨어지므로 반드시 잡초가 발생하기 전 또는 이미 발생된 잡초를 제거한 후 사용하십시오.
3. 이 농약은 쇠비름, 명아주, 자귀풀 등 광엽잡초가 많이 발생하는 곳에서는 약효가 떨어지므로 사용에 주의하십시오.
4. 이 농약을 파에 사용할 때에는 노지 이식재배지에서만 사용하십시오. (입제)