

비선택성제초제

풀마름 액제

- 품목명 : 벤틀존소듐·글루포시네이트암모늄 액제
- 유효성분 : Bentazone-sodium 10% + Glufosinate-ammonium 14%
- 계통 : 벤조티아디아지논계(H06) + 포스피낙에시드계(H10)
- 독성 : 저독성, 어독성 Ⅲ급
- 포장단위 : 500ml

비선택성제초제의 현명한 선택! 안전한 풀마름!

빠른 약효발현

약제 살포 후 2~5일 부터 약효가 신속히 발현됩니다.

후작물 안전성

토양에 떨어진 유효성분이 미생물에 의해 신속히 분해되므로 후작물에 안전합니다.

오랜 지속효과

잡초 지상부를 완전히 고사시키며 동시에 다년생 잡초의 재생을 장기간 억제합니다.

강한 내구성

우수한 내구성으로 안정적인 약효를 발현합니다.



쇠뜨기



개망초

적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
감자(휴간)	일년생잡초	잡초생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리(비닐피복재배)	60ml	300ml	100ℓ
고추(휴간)					
고려엉귀(곤드레나물)					
마늘 / 무 / 배추					
양파(휴간)					
참외(휴간)					
콩(휴간)					
감귤	일년생 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리	100ml	500ml	150ℓ
대추					
밤					
배 / 복숭아 / 사과					
포도					
논둑					
비농경지					



사용
방법


1. 이 농약은 잡초생육기 경엽처리용 비선택성제초제이므로 잡초가 충분히 자랐을 때 잎과 줄기에 약액이 충분히 골고루 묻도록 살포하십시오.
2. 이 농약은 살포한 후 경운하거나 잡초를 베고자 할 경우에는 안정된 약효가 발현될 수 있도록 10일 이상 지난 후 실시하십시오.
3. 이 농약은 잡초의 키가 20~30cm 정도 자랐을 때 뿌리면 가장 효과적이며 잡초의 키가 30cm 이상 커지거나 발생밀도가 높을 경우에는 정도에 따라 약량을 증가하여 뿌리거나 30cm 이하로 예초한 후 사용하십시오. 단, 채소 및 밭고랑(휴간) 처리인 경우 잡초가 10~15cm 정도 자랐을 때 살포하십시오.



주의
사항

1. 이 농약은 비선택성제초제이므로 약액이 농작물의 잎은 물론 어린줄기 및 과실 등에 묻을 경우 약해가 발생하오니 약액이 농작물에 묻지 않도록 주의하십시오.
2. 발작물의 생육기 헛골처리나 논둑에 사용할 경우에는 분무기 노즐에 비산방지 덮개를 부착하여 살포된 약액이 작물에 묻지 않도록 주의하십시오.

빠르고 오래가는 방제효과



초종별 방제효과



강한 내우성

• [강우량] 15mm 이내 • [강우시간] 30~40분 이내 • [강우조건] 약제처리 후 1~2시간 이내

