

파워리놀 입제

- 품목명 : 나프로파마이드 입제
- 유효성분 : Napropamide 2.5%
- 계통 : 아마이드계 (H15)
- 독성 : 저독성, 어독성 Ⅲ급
- 포장단위 : 2kg



제품형태

약해에 안전한 원예용 제초제

잡초 발생직전에 사용하는 제초제

아마이드계통의 제초제로 잡초 발생직전에 사용하는 토양처리형 제초제입니다.

화본과 잡초 및 광엽 잡초에 효과

밭에 발생하는 일년생 화본과 잡초 및 일부 광엽 잡초에 대한 제초효과가 있습니다.



바랭이



강아지풀

적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용량
고추	일년생잡초	정식전(비닐피복전) 토양처리	4 kg
들깨		정식전 토양처리	
무		파종복토후 3일 이내 토양처리	
배추		정식전(비닐피복전) 토양처리	
참깨		정식전 토양처리	
콩		파종복토후 3일 이내 토양처리	



사용 방법

1. 이 농약은 사용시기와 사용약량을 꼭 지켜 사용하시고, 심한 모래땅에서는 사용하지 마십시오.
2. 잡초 발생 전 토양표면을 잘 고름 다음 살포하십시오.
3. 이미 발생한 잡초는 방제효과가 떨어지므로 기 발생된 잡초는 제거 후 사용하십시오.
4. 비닐피복재배 : 정지작업을 균일하게 한 다음 약제를 살포하고 비닐피복을 한 후 2~3일 이내에 이식하십시오.
단, 무공비닐이나 흑색비닐 피복재배에서는 절대 사용하지 마십시오.



주의 사항

1. 과습한 토양에서는 약해가 발생하기 쉬우며, 기온으로 인하여 토양이 몹시 건조할 때는 약효가 떨어질 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
2. 반드시 잡초가 발생하기 전 또는 이미 발생한 잡초를 제거한 후에 뿌리십시오. 단, 쇠비름이 많은 밭에서 경운이나 로타리 후에 살포할 때에는 조각난 쇠비름의 방제가 어려우니 주의하십시오.
3. 약제처리시 토양입자가 잘 분쇄되지 않아 흙덩이가 불균일하면 약효가 저하될 수 있으니 토양분쇄작업을 완료한 후 약제를 살포하십시오.
4. 시설재배/하우스 내와 같은 밀폐된 곳에서 사용하지 마십시오.
5. 작물 헛골 등에 살포할 때에는 가능한 작물에 묻지 않도록 살포하고 이슬이 마른 후에 살포하십시오.
6. 이 농약을 살포할 때는 기준량을 지켜 살포하십시오.