

종합살균제 (스트로빌루린계)

액상수화제

수비탄

- 품목명 : 트리플록시스트로빈 액상수화제
- 유효성분 : Trifloxystrobin 22%
- 계통 : 스트로빌루린계(다3)
- 독성 : 저독성, 어독성1급
- 포장단위 : 100ml, 250ml

NEW
신제품

비 오기 전 준비, 우기 중에도 걱정없는 병해 방어!

• 탁월한 내우성 및 우수한 예방효과

뛰어난 내우성으로 장마 직전 또는 우기 중에도 안정적인 방제 효과를 유지합니다.

• 광범위한 종합살균제

다양한 병해에 대해 우수한 방제효과를 나타내며, 과수·채소류 등 다양한 작물에 적용 가능합니다.

• 안정적인 약효 지속효과

유효성분이 잎 표면의 왁스층에 안정적으로 부착되어 작물체에 고르게 분포되며, 약효가 오랫동안 지속됩니다.

• 내성 병원균에 대한 우수한 효과

다양한 작용 경로를 통해 작물체 내, 외부에서 동시에 작용하는 차별화된 작용 특성으로, 저항성 병원균에 대해서도 안정적인 방제효과를 기대할 수 있습니다.

• 칼슘 대사 증진 효과

고추 살포 시 부수효과로 수분 스트레스를 완화하여 칼슘 대사 촉진에 도움을 줍니다.



「수비탄」 액상수화제 작용기작

작물체 내·외부 동시작용



다양한 작용 경로로
작물체 내·외부에서 동시에 작용하여
안정적인 방제 효과를 나타냄

미토콘드리아 호흡 저해 작용 (Qoi)

병원균의 포자 형성·확산을 억제하고,
포자 발아와 초기 감염 단계를
효과적으로 차단

잎 표면의 왁스층에 강하게 결합

지질 친화성이 높아 잎 표면의
왁스층에 강하게 결합하고,
약제를 빠르게 흡수

뛰어난 침투이행성 및 확산 효과

약제가 작물체 내부로 침투·이행하고
일부는 기체 상태로 확산되어
표면으로 재분배

• 우수한 예방 효과

• 우수한 내우성
• 긴 약효 지속기간

• 살포되지 않은
주변 부위까지 보호



www.hescience.co.kr

HE (주)한일사이언스

☎ 고객상담전화 1661-4166

• 안전사용기준을 잘 지켜 우수농산물을 생산합니다. • 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. • 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
• 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. • 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

비 오기 전 준비, 우기 중에도 걱정없는 병해 방어!

수비탄

액상수화제



전체 등록 사항 확인 ▶

※ 기타 자세한 등록사항은 '농촌진흥청 농약안전정보시스템'에서 확인 가능합니다.

총 76작물 28대상 등록

밭작물 (58개 작물) : 가지, 고구마, 고추(단고추류), 마늘, 무, 배추, 부추, 상추(양상추), 수박(복수박), 생강, 양배추, 인삼, 오이, 콩 등
과수작물 (18개 작물) : 감(단감), 감귤, 무화과, 복숭아, 사과, 살구, 석류, 오미자, 유자, 포도 등

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준				
				사용시기	사용횟수			
가지	갈색무늬병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 3일전	3회 이내			
감(단감)	둥근무늬낙엽병			수확 21일전	4회 이내			
감귤	검은점무늬병			수확 30일전	3회 이내			
갯	뿌리혹병	정식 당일 관주처리	8mℓ (1ℓ/㎡)	파종(정식)기	1회 이내			
갯기름나물(방풍)	흰가루병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	3회 이내			
겨자채								
고구마	덩굴썩음병	정식 시 관주처리	8mℓ (1ℓ/㎡)	정식기	1회 이내			
고들빼기	흰가루병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	3회 이내			
고려엉겅퀴(곤드레나물)								
고추(단고추류)	탄저병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 3일전	3회 이내			
고추(잎)	갈색점무늬병			수확 7일전		1회 이내		
곤달비	흰가루병							
공심채	점무늬병							
구기자	흰가루병							
근대	잣빛곰팡이병							
	탄저병							
마늘	잎마름병			발병 초부터 경엽처리		10mℓ	수확 7일전	3회 이내
무								
배추	뿌리혹병			정식 당일 관주처리		8mℓ (150mℓ/주)	정식당일	1회 이내
복숭아	잣빛무늬병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회 이내			
부추	잎마름병							
	흑색씩음균핵병							
붉은꽃인동덩굴	흰가루병					발생초기	-	
비트	잣빛곰팡이병	꽃이 피기 5일전 및 꽃이 진 후부터 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	2회 이내			
뽕나무(잎)	균핵병							
사과	눈마름병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 21일전	5회 이내			
살구	탄저병							
상추(양상추)	잣빛무늬병					수확 14일전	3회 이내	
	갈색점무늬병							
	흰가루병					수확 5일전	3회 이내	
생강	잎집무늬마름병	수확 7일전	2회 이내					
석류	열매씩음병	착과기부터 경엽처리	5mℓ	수확 14일전	3회 이내			
	탄저병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 7일전	4회 이내			
수박(복수박)	덩굴마름병							
양배추	뿌리혹병	정식기 관주처리	8mℓ (1ℓ/㎡)	정식기	1회 이내			
오이	흰가루병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 2일전	3회 이내			
참깨				수확 7일전				
청경채	뿌리혹병	정식기 관주처리	8mℓ (1ℓ/㎡)	파종·정식기	1회 이내			
콩	미이라병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회 이내			
포도	갈색무늬병			수확 21일전	4회 이내			